

XILOTOX-4

CONSTRUCCIÓN / INSECTICIDA



XILOTOX- 4 es un insecticida para ser utilizado en madera, contra el ataque de termitas, barrenillos y comejen.

USOS Y APLICACION

En madera al natural y seca, Xilotox - 4 debe de utilizarse mezclado con Xilobor, a razón de : 100ml de Xilotox- 4 disuelto en un galón de Xilobor.

En madera que tiene algún tipo de acabado, utilice agua para diluir el Xolotox - 4.

La aplicación debe de realizarse con brocha, spray, o cualquier otro tipo de herramienta que permita aplicar una película fina y uniforme del producto sobre la madera.

Si va a aplicar Xilotox - 4 en madera con algún tipo de acabado, debe de limpiar el excedente del producto con un trapo humedecido, quince minutos después de hecha la aplicación..

Prepare solamente la cantidad de Xilotox - 4 que

va a utilizar en el momento de la aplicación.

Xilotox - 4 no tiene efecto residual.

PRESENTACION:

Puede encontrar Xilotox - 4 en envases de 30 ml, 110 ml, 500 ml y 1 litro.

PRECAUCIONES:

OJOS: Si el Xilotox - 4 entra en contacto con los ojos, puede causar moderada irritación y daño temporal en la córnea.

Se recomienda utilizar lentes de protección.

PIEL: Si entra en contacto con la piel, prolongadas o repetidas exposiciones puede causar quemaduras o resequedad en la piel.

Se recomienda usar guantes y ropa impermeable

INGESTION: Pequeñas cantidades que sean ingeridas incidentalmente durante una operación normal no deben causar daños, pero la ingestión de grandes cantidades del producto pueden causar lesiones serias o incluso la muerte.

EFFECTOS SISTEMICOS: La exposición excesiva al producto puede causar inhibición de la Colinesterasa, dolor de cabeza, diarrea, salivación, visión nublada, dilatación de las pupilas, calambres abdominales, ganas de orinar frecuentemente y otros efectos en el sistema nervioso central.

PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: Lavar con agua abundante por lo menos durante 15 minutos.

PIEL: Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Retire tan pronto como pueda la ropa y zapatos contaminados. Déjese ver por un médico.

INGESTION: No inducir al vómito. Llame a un médico o traslade al paciente al hospital más cercano.

INHALACION: Retire rápidamente al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado. Busque atención médica.

Alto de Ochomogo - Cartago, Costa Rica

Tel: (506) 2279-7985 / Fax: (506) 2279-39-37 / Email: info@grupoxilo.com